Autopista Bogotá – Medellín km. 3.4 Tel: (57-1) 8415771 - 8415055
Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13 Bogotá D.C. – Colombia

FICHA TÉCNICA

PREDOSTAR®

TIPO DE FORMULACIÓN: WP (Polvo soluble)

USO: FUNGICIDA

INGREDIENTE ACTIVO:

Propamocarb 100g/kg, Nombre IUPAC: Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate hydrochloride Metalaxyl: 150 g/kg Nombre IUPAC: Methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate

EMPRESA FORMULADORA: JIANGSU BAOLING CHEMICAL CO., LTD.

China

TITULAR DEL REGISTRO:

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA

INTEROC CUSTER

Autopista Medellín Km 3.4
Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13
Cota – Colombia
Telf: 8415771 - 8415055

REGISTRO NACIONAL ICA No. 529

MODO DE ACCIÓN:

PREDOSTAR es un fungicida de contacto, sistémico y erradicante. Es absorbido a través de las raíces, tallos y hojas rápidamente.

USO AGRÍCOLA

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

*USO ORNAMENTALES			
CULTIVO	**BLANCO BIOLÓGICO**	**DOSIS**	**P.R**
Rosa (*Rosa sp.*)	Mildeo velloso *(Peronospora sparsa)*	1.56 kg/ha ó 1.3 g/l	24 horas

** Pruebas de Fitotoxicidad en ROSA (Rosa sp.), CLAVEL (Dianthus caryophyllus) Y POMPÓN (Crysantemum sp.).*

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C	P.R
Papa *(Solanum tuberosum* L.*)*	Gota o Tizón Tardío (*Phytophthora infestans*)	1.6 kg/ha	21 días	24 horas
Tomate (*Lycopersicum sculentum)*		0.9 kg/ha ó 300 g/200 l	10 días	24 horas
Cebolla (*Allium cepa* L.)	Mildeo velloso (*Peronospora destructor*)	0.9 kg/ha ó 300 g/200 l	14 días	24 horas

P.C: Período de carencia
P.R: Período de reentrada

MODO DE EMPLEO:

PREDOSTAR es un fungicida que se debe aplicar cada 7 a 14 días, dependiendo de las condiciones agro-climáticas y la presencia de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD:

No se recomienda mezclar con otros productos por problemas de incompatibilidad que puedan presentarse. En caso de necesidad de estas mezclas, se recomienda realizar primero pruebas sobre un pequeño número de plantas y evaluar tanto la efectividad como los problemas de manchado o pérdida de calidad de planta, antes de hacerlo a gran escala. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.

PRECAUCIONES:
No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar PREDOSTAR, en la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.
Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas y realizar las aplicaciones en horas tempranas.
Evite contaminar con PREDOSTAR las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II MODERADAMENTE PELIGROSO

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (1) 2886012.

AVISO AL AGRICULTOR: el fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.